

Kancsalság felismerése, teendők a felismerést követően

Felismerés:

Hirschberg-teszt: (fénypont teszt, corneális reflex teszt) azt figyeljük, hogy a fényreflex mindkét szemben a szaruhártya centrumában van-e, vagy az egyik excentrikus-e. 1mm eltérés a centrumtól kb 7 foknyi kancsalságnak felel meg

Cover teszt: takarásos teszt során a beigazító mozgásokat figyeljük,

Teendő:

Gyermekszemészhez küldeni minél hamarabb, bármilyen korú kancsalról van szó. Ha akutan lép fel, pár napon belül!

Fontos:

- A kancsalság életet veszélyeztető betegség (retinoblastoma!!!) tünete lehet.
- Hypermetropia a leggyakoribb fénytörési hiba, ami kancsalságra hajlamosít.

Kancsalság komplex kezelése gyermekszemész szemmel:

1. A teljes fénytörési hiba meghatározása tágításban, a korrekció megadása
2. Amblyopia elleni kezelés
3. Alternálás esetén váltott takarás
4. Műtét lehetőleg 2-3 éves korban
5. A műtét után is szükséges lehet még a fénytörési hiba további kezelése szemüveggel, a szemüveg viselés nem szűnik meg a műtéttel.
6. Kétszemes együttlátás lehető legteljesebb elérése a cél, fúzió és sztereo látás fejlesztése