

Conjunctivitis és iritis elkülönítése

Az akut kötőhártya gyulladás és az akut szivárványhártya gyulladás elkülönítése a két kórkép jelentősen eltérő lefolyása és különböző kezelése miatt elengedhetetlen jelentőségű.

	Conjunctivitis (kötőhártyagyulladás)	Iritis (szivárványhártya gyulladás)
Szubjektív tünetek	Váladékozás, égő, szúró vagy idegentest érzés, viszketés, mérsékelt fájdalom, fénykerülés, könnyezés	tompa fájdalom, kifejezett fénykerülés
Látóélesség	Többnyire megtartott, ritkán enyhén csökkent (könnyezés, váladék miatt)	Megtartott vagy csökkent
Objektív tünetek	Conjunctivális belövelltség	Ciliáris vagy vegyes belövelltség
	Szaruhártya felszíne sima, csillogó, állománya, hátlapja tiszta	Szaruhártya hátlapján precipitátumok
	Elülső csarnok tiszta	Elülső csarnokban gyulladásos sejtek, Tyndallizáció, fibrin, hypopyon vagy hyphaema
	Iris színe, rajzolata megtartott Pupilla közepesen tág, fényre akkomodációra jól reagál	Iris rajzolata elmosott, Pupilla szűk, renyhén reagál Hátsó synechiák



1. ábra Conjunctivális belövelltség




2. ábra Ciliáris belövelltség



2. ábra Precipitátumok a szaruhártya hátlapján



3. ábra Tyndallizáció az elülső csarnokban
(www.atlasophthalmology.com)



4. ábra Hátsó synechiák (www.atlasophthalmology.com)