

Pangásos papilla tünetei, felismerése utáni teendők


Pangásos papilla észlelése a szemfenéken intracraniális nyomásfokozódás jele, mely az esetek legnagyobb részében intracraniális tumor miatt alakul ki.

Általános és szemészeti panaszok:

- Fokozódó fejfájás
- Hányinger, hányás
- Tudati állapot hanyatlása, somnolencia
- A látás átmeneti, pár másodpercig tartó elhomályosodása
- Esetenként diplopia (n. VI érintettsége esetén), szemmozgászavarok
- Látásromlás nincs (csak késői fázisban)

Objektív tünetek:

- a látóidegfő hyperaemiás, , promineál, határa elmosódik
- az elváltozás szinte mindig bilaterális, asszimetria lehetséges
- a peripapilláris régióban radiér lánnyelv-szerű vérzések, puha exudatumok (cotton-wool), retina redőződése
- a vakfolt megnagyobbodott, CFF normális



www.kellogg.umich.edu

Differenciál diagnózis:

1. EION: akut látásromlás
2. Neuritis nervi optici: akut látásromlás
3. Pseudopapillaoedema: drusen papillae-nincseek vérzések, exudatumok, panaszmentes beteg, UH kép,

Teendők:

1. Az intracraniális nyomásfokozódás okának felderítéséhez sürgős MRI vizsgálat
2. Idegsebészeti, neurológiai konzilium
3. Diuretikumok adás (mannitol, acetazolamide, thiazidok)
4. Funkció követése: látótér, látóélesség, funduskép