

Amblyopia

A tompalátás a nem megfelelő látásfejlődés következtében kialakult állapot. A szemben organikus eltérés nem észlelhető, vagy a meglévő elváltozás a csökkent látásélességet nem magyarázza. Leggyakrabban unilaterális.

Felismerés:

Mindkét szem látásélességének vizsgálata külön-külön

Csecsemőnél, kicsi gyereknél: tiltakozik az ép szem letakarásakor

Szűrővizsgálaton kell keresni!

Fajtái:

- kancsalsághoz társuló amblyopia
- anisometriához társuló amblyopia
- deprivációs amblyopia (törőközegek homálya vagy átlátszatlansága miatt alakul ki, pl. cataracta, üvegtesti v corneális homályok, ptosis)

Kezelése:

Jelenleg a látásfejlődés szempontjából aktív időszakban van lehetőségünk a kezelésre, mely 8-10 éves korig tart, a kezelést ezért minél hamarabb el kell kezdeni. Megfelelő kezelés mellett 2 éves korban 100%-os látásélesség érhető el, a látásjavulás prognózisa az életkor növekedésével egyre csökken.

- occusio - takarásos kezelés: a domináns szem takarása (nem a szemüveget takarjuk, hanem a szemet! Ha túl hosszú ideig takarjuk a domináns szemet reverz amblyopia jöhet létre!)
- penalizáció: a domináns szem elé olyan üveget helyezünk, amivel homályos kép jut ebbe a szembe