

Teendők áthatoló szemsérülés gyanúja esetén

Szubjektív tünetek: fájdalom, látásromlás (nem mindig!), vérzés, szempirosság

Objektív tünetek: vérzés, áthatoló seb (cornea, köröhártya, sclera), kötőhártya bevérvése (suffusio- sokszor elfedi a scleralis behatolás helyét), iris előreesése (prolapsus iridis), sekély elülső csarnok, csarnok hiánya (athalamia), körte alakú pupilla, lencsehomály, csökkent szemnyomás (hypotonia bulbi)

Vizsgálat:

elülső szegment: vizsgálatán kívül fontos a szemfenék vizsgálata is (van-e ott is idegentest?)
kiegészítő, nem szemészeti vizsgálatok: Rtg, UH, CT (fém idegentest lokalizáció)
Fém idegentest gyanúja esetén MR vizsgálat végzése tilos!

Therápia:

Felismeréskor:

- * steril kagylós fedőkötéssel lássuk el a beteget
- * ha biztos, hogy a sérülés áthatoló: orbita CT-t kell készíttetni! (idegentest keresése)
- * tetanus
- * sürgősen, mentővel szemészeti ügyeletre küldeni a beteget
- * áthatoló sérülésnél tilos a, a szem nyomkodása, a szemnyomást csak nagyon óvatosan tapintani!!!

Szemészeten:

- * a seb összevarrása, az idegentest eltávolítása, sz.e. vitrectomia műtéttel.
- * konzervatív kezelés: helyi és általánosan adott antibioticum
szteroid (szintén helyi és ált.)
NSAID