

Artéria centrális retinae elzáródás tünetei, akut kezelése

Szubjektív tünetei:


Törzselzáródás: féloldali, fájdalomtalan, hirtelen látásvesztés (kml, fé – az esetek 95%-ban)

Ágelzáródás – látásromlás – attól függően, hogy a macula vérellátása milyen mértékben érintett, látótérkiesés

Anamnézisben: amaurosis fugax, TIA, stroke, szívbetegség szerepelhet

Objektív tünetei:

- retina sápadt – ischemia következtében
- foveában cseresznyepiros folt
- nagyon szűk vagy elzáródott retinális artériák
- halvány papilla (nem mindig)
- relatív afferens pupilláris defektus



Kezelés:

A betegségnek bizonyítottan hatásos kezelése nem ismert. Egyes vélemények szerint az alábbi beavatkozások eredményes lehetnek, ha az elzáródás után minél hamarabb (lehetőleg: 90-120 perccel) elkezdjük.

A beavatkozás teoretikus célja: az embolus nagyobb érágból kisebb ágba juttatása

- 1. szem megnyomása majd hirtelen elengedése többször egymás után
- 2. gyors szemnyomás csökkentés: - Acetazolamid – szájon át vagy intravénásan , Acetazolamid és béta-blokkoló szemcsepp
- 3. csarnokpunkció
- im. görcsoldó (pl. No-Spa) adása: az érgörcs oldására

Recidiva megelőzése: embóliaforrás kimutatása – belgyógyászati kivizsgálás (süllyedés (óriássejtes arteritis kizárása), vérkép, HgbA1C, hypertonia, carotis doppler, ECG, stb.) , kezelés, szemészeti kontrollvizsgálat (esetleges neovascularis szövődmény időbeni felismerése és kezelése (panretinalis lézer kezelés) céljából.